

Decision Tool Angststoornis, Dwangstoornis en PTSS

Doel

Deze Decision Tool is ontwikkeld om op een eenvoudige en evidence based wijze tijdens de intake in de specialistische ggz onderscheid te kunnen maken tussen patiënten met problematiek die geïndiceerd zijn voor specialistische ggz en patiënten met complexe en/of zeldzame problematiek die geïndiceerd zijn voor hoogspecialistische/topklinische ggz.

Ook bij een intake in de hoogspecialistische ggz/topklinische ggz kan dit instrument gebruikt worden om te checken of het een juiste verwijzing betreft.

Het instrument is vooral een hulpmiddel bij de indicatiestelling voor hoogspecialistische/topklinische zorg. Uiteraard is het altijd mogelijk om beredeneerd af te wijken van de uitkomst van de lijst, rekening houdend met het klinisch oordeel en de wensen en mogelijkheden van de patiënt.

Het invullen van de decision tool zal maximaal 5 minuten duren.

Instructie

De Decision Tool dient te worden afgenomen in de intakefase. Daar waar de formele diagnostiek nog niet is afgerond mag de Decision Tool worden ingevuld op basis van een gefundeerd vermoeden.

Basisgegevens

Naam patiënt:

Datum afname:

Naam intaker:

Decision Tool Angststoornis, Dwangstoornis en PTSS

		Opmerking
1. Is er voor de huidige primaire diagnose sprake van een eerdere niet succesvolle evidence based behandeling in de specialistische GGZ?	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	<input type="text"/>
2. Zijn er moeilijk te beïnvloeden sociale factoren die de angststoornis, dwangstoornis of PTSS onderhouden? Aanwijzing: Denk óók aan een beperkte opleiding, werkloosheid, gebrekkig of afwezig steunsysteem, gevolgen van slechte lichamelijke gezondheid, disfunctionerende gezinsinteracties en andere stresserende levensgebeurtenissen.	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	<input type="text"/>
3. Is er sprake van ernstig sociaal-maatschappelijk disfunctioneren dat interfereert met de behandeling van de angststoornis, dwangstoornis of PTSS? Aanwijzingen: <ul style="list-style-type: none">Een GAF\leq50 of WHODAS\geq130 is een aanwijzing voor ernstig disfunctioneren.Van interfereren is sprake wanneer het sociaal-maatschappelijk disfunctioneren het psychiatrisch beeld van de hoofdstoornis of de behandeling daarvan compliceert.	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	<input type="text"/>
4. Is er sprake van disadaptieve coping die interfereert met de angststoornis, dwangstoornis of PTSS behandeling? Aanwijzing: Denk aan gebrek aan motivatie, gebrek aan compenserende individuele kenmerken en een laag gevoel van zelfeffectiviteit.	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	<input type="text"/>
5. Is er ten minste één gediagnosticeerde comorbide psychische stoornis die interfereert met de behandeling van de angststoornis, dwangstoornis of PTSS? Aanwijzingen: <ul style="list-style-type: none">Denk óók aan persoonlijkheidsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen, verslaving en verstandelijke beperkingen.Van interfereren is sprake wanneer de gediagnosticeerde comorbide psychische stoornis het psychiatrisch beeld van de hoofdstoornis of de behandeling daarvan compliceert.	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	<input type="text"/>
6. Is de angststoornis, dwangstoornis of PTSS ernstig? Aanwijzing: naast een algemene klinische indruk wat betreft ernst scoort de patiënt hoog op één van de volgende vragenlijsten: <ul style="list-style-type: none">Algemene lijsten: SCL-90 hoog of zeer hoog in vergelijking tot een normgroep van patiënten in de ambulante ggz; BSI hoog of zeer hoog in vergelijking tot een normgroep van patiënten in de ambulante ggz is een aanwijzing voor een ernstige stoornis.Angststoornis: BAI \geq26.Dwangstoornis: Y-BOCS \geq24; gering/ontbrekend realiteitsbesef.PTSS: CAPS-5 gemiddelde itemscore $>$3; PCL-5 gemiddelde itemscore $>$3; DSM-5 ernstig is een aanwijzing voor ernstige PTSS.	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	<input type="text"/>
7. Is er sprake van actuele suïcide dreiging en/of zelfdestructief gedrag?	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	<input type="text"/>
8. Indien OCS, zijn er 2 of meer OCS subtypes aanwezig? Voorbeelden van OCS subtypes zijn: <ul style="list-style-type: none">WasdwangControledwangVerzameldwangDwang m.b.t. symmetrie/ordenen/tellenGewelddadige/godslasterlijke/seksuele intrusies	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee <input type="radio"/> geen OCS	<input type="text"/>
9. Aantal maal positief (=ja) gescoord \geq 4? <ul style="list-style-type: none">Ja ---> Geïndiceerd voor hoogspecialistische zorg op basis van de Decision ToolNee ---> Niet geïndiceerd voor hoogspecialistische zorg op basis van de Decision Tool		